

Contexto	Especie		Tipo	Rasgos diagnósticos-identificación taxonómica		Técnica de procesamiento	Posible preparación	Rasgos diagnósticos-procesamiento
				Dimensión (mm)	Forma			
B1 30-40	<i>P. chilensis</i>		Semilla	L=5,86; A=3,5; E=2,95; DLF=2,43; APLF=1,02; DCLF=0,51	Elíptica	Mortereado	Harina-Aloja/añapa	Levantamiento testa
	<i>P. flexuosa</i>		Endocarpo fragmentado con semilla	L=7,4; A=6,21; E=3,54	Redondeada	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches, extremos levantados, deteriorado; Meso: TSA, HFV
			Artejo	L=9,02; A=7,67; E=3,83	Apiculada	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches, extremos levantados; Meso: TSA, HFV
Total		3						
B1 40-50	<i>P. chilensis</i>		Endocarpo	L=9,9; A=7,68; E=4,75	Ovalado y umbonado	Hidratación. Marca de corte	Aloja/añapa	Fisurado, protuberancias
			Semilla	L=6,88; A=3,38; E=1,75; DLF=1,69; APLF=1,01; DCLF= 0,68	Elíptica	Hidratación	Aloja/añapa	Testa arrugada, parcialmente ausente, eE
	<i>P. cf. P. chilensis</i>		Artejo fragmentado	L=12,7; A=11,42; E=4,14	Apiculada	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: arrugas longitudinales; Meso: TSA; sin semilla
	<i>Prosopis</i> posible híbrido		Endocarpo fragmentado con semilla	Endo: L=8,86; A=8,1; E=3,77; Sem: L=6,45; A=4,67	Umbonado	Hidratación	Aloja/añapa	Endo: fragmentado, limpio; Sem: testa fuertemente dividida, fisura transversal pronunciada

	<i>P. flexuosa</i>		Fragmento de vaina	L=15,06; A=7,47; E=4,5	Sub-moniliforme	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches, extremos levantados, deteriorado; Meso: TSA, HFV
Total		5						
B1 50-60	<i>P. flexuosa</i>		Endocarpo	L=7,84; A=6,04; E=3,27	Romboidal	Mortereado	Harina ¿no refinada?- Aloja/añapa	Meso adherido: TC
			Endocarpo fragmentado con semilla	L=8,18; A=5,89; E=3,23	Romboidal	¿Hidratación?	-	Endo: fisurado; posible mesocarpo adherido
			Medio artejo	L=7,3; A=6,46; E=2,23	Apiculado	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: agujeros, protuberancias, extremos levantados; Meso: textura TSA, HFV
	<i>P. chilensis</i>		Fragmento de vaina	L=7,43; A=5,61; E=0,58	Aplanada	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches; Meso: TSA; Sem: fragmentada
	<i>Prosopis spp.</i>		Medio artejo fragmentado	L=6,03; A=4,98; E=2,5	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: fragmentado, protuberancias; Meso: TSA
Total		5						
B1+30 sector entre piedras	<i>P. chilensis</i>		Artejo	L=10,56; A=8,03; E=2,93	Romboidal	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA; Endo: fragmentado; sin semilla
			Semilla	L=6,19; A=4,26; E=2,82; DLF=2,42; APLF=1,14; DCLF=0,91	Elíptica	Hidratación	Aloja/añapa	Testa deteriorada con agujeros, resto de vaina adherido

	<i>P. flexuosa</i>		Semilla	L=5,46; A=3,71; E=2,51; DLF=1,48; APLF=1,42; DCLF=0,98	Ovoidal	Mortereado	Harina refinada- Aloja/añapa	Testa fisurada, levantada en la LF
			Mitad apical de semilla	L=3,35; A=3,01; E=2,43; DLF=1,80; APLF=1,4	Elíptica	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, parcialmente ausente
	<i>Prosopis</i> spp.		Mitad apical de semilla	L=3,83; A=3,28; E=2,4	-	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, levantada en la LF, eE
			Artejo fragmentado	L=6,42; A=2,18; E=2,47	-	-	-	-
			Artejo fragmentado	L=6,34; A=2,4; E=2,44	-	-	-	-
	Leguminosa cf. <i>Prosopis</i> spp.		Semilla fragmentada	L=5,15; A=1,54; E=1,31	-	-	-	-
Total		8						
B130+ entierro	<i>Prosopis</i> spp.		Valva de endocarpo fragmentada	L=2,02; A=1,53; E=0,64	-	-	-	-
			Valva de endocarpo fragmentada	L=2,16; A=1,31; E=0,6	-	-	-	-
			Endocarpo fragmentado	L=4,55; A=1,86; E=1,39	-	-	-	-
			Endocarpo fragmentado	L=4,81; A=1,48; E=1,4	-	-	-	-
			Mitad apical de semilla	L=3,97; A=2,85; E=1,01	-	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, ausente en una cara; eE; Meso adherido: TSA, HFV
			Valva de endocarpo fragmentada	L=5,39; A=4,82; E=0,85	-	-	-	-

		Endocarpo fragmentado	L=3,96; A=2,44; E=0,68	-	-	-	-
<i>P. flexuosa</i>		Semilla	L=5,05; A=4,55; E=2,95; DLF=1,58; APLF=1,2; DCLF=0,29	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, levantada; eE; cotiledón visible
		Semilla	L=4,98; A=3,68; E=2,64; DLF=2,3; APLF=0,95; DCLF=0,63	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, ausente en una cara; eE
		Semilla	L=5,43; A=3,62; E=1,96; DLF=1,93; APLF=0,94; DCLF=0,97	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, ausente parcialmente; eE
<i>P. chilensis</i>		Semilla	L=6,3; A=4,07; E=2,77; DLF=2,98; APLF=1,07	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa cuarteada, parcialmente ausente; fractura longitudinal pronunciada; eE
		Semilla	L=6,14; A=4,03; E=3,35	Romboidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa fisurada, mayormente ausente; tegmen visible
<i>P. cf. P. chilensis</i>		Mitad basal de semilla	L=6,32; A=5,04; G=2,34	-	Hidratación	Aloja/añapa	Testa levantada, fisurada, arrugada; eE; cotiledón visible; semilla deformada
		Semilla	L=5,51; A=2,84; E=2,67; DLF=1,61; APLF=1,94; DCLF=0,72	Elíptica	Hidratación	Aloja/añapa	Testa arrugada, ausente parcialmente; eE

	<i>Prosopis</i> spp. posible híbrido		Semilla	L=5,97; A=3,5; E=1,82; DLF=1,98; APLF=1,54; DCLF=1	Elíptica	Sin procesamiento	-	Testa quebradiza, lustrosa
Total		15						
B1 puco	<i>P. cf. P.</i> <i>flexuosa</i>		Semilla fragmentada	L=4,34; A=3,8; E=2,44; DLF=2,16; APLF=0,62; DCLF=0,54	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa arrugada, cuarteada, ausente parcialmente; fractura longitudinal pronunciada; eE
	<i>Prosopis</i> spp.		Artejo fragmentado	L=3,66; A=3,79; E=1,84	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: fisurado, bien conservado; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=2,8; A=2,05; E=0,84	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: parches, arrugas, extremos levantados; Meso: TSA, HFV
			Artejo fragmentado	L=4,32; A=2,75; E=1,47	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: fisurado, bien conservado; Meso: TSA, HFV; Endo: protuberancias
			Artejo fragmentado	L=3,18; A=1,72; E=0,92	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=0,96; A=0,85; E=0,5	-	Hidratación	Aloja/añapa	Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=4,04; A=2,27; E=0,55	-	Hidratación (¿agua caliente)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA

			Artejo fragmentado	L=4,42; A=2,07; E=0,84	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=2,09; A=1,61; E=0,56	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=3,16; A=1,59; E=0,95	-	Mortereado	Harina-Aloja/añapa	Meso: TC
			Artejo fragmentado	L=2,1; A=1,67; E=0,45	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=1,7; A=1,39; E=0,71	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados, separados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=1,85; A=0,94; E=0,39	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=1,21; A=0,78; E=0,35	-	Hidratación (¿agua caliente?)	Aloja/añapa	Epi: ausente; Meso: TSA, HFV
			Artejo fragmentado	L=1,23; A=1,11; E=0,26	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: extremos levantados; Meso: TSA
			Artejo fragmentado	L=2,74; A=2,05; E=0,5	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: bien conservado, extremos levantados; Meso: TSA
Total		16						
A1 30-40	<i>Prosopis</i> spp.		Endocarpo fragmentado con semilla	L=5,64; A=3,52; E=3,21	-	Mortereado	Harina no refinada-Aloja/añapa	Endo: fisurado; Sem: fragmentada, testa fisurada, ausente parcialmente; cotiledón visible

			Endocarpo fragmentado	L=6,53; A=3,66; E=0,62	-	Hidratación	-	Superficie fisurada, dos tonalidades: 1- oscura, opaca; 2- clara
Total		2						
A1 40-50	<i>P. flexuosa</i>		Semilla	L=5,15; A=4,27; E=2,16; DLF=1,72; APLF=1,03	Redondeada	Hidratación	Aloja/añapa	parches de testa; extrusión y expansión endosperma
	<i>Prosopis</i> spp.		Medio endocarpo con semilla y mesocarpo	L=6,96; A=5,4; E=2,62	Ovoidal y umbunado	Mortereado	Harina	Endo: fisuras en V
			Medio endocarpo con semilla	L=4,69; A=4,83; E=2,49	-	Mortereado	Harina-Aloja/añapa	Endo y sem: fragmentados transversalmente
			Endocarpo fragmentado	L=5,82; A=4,46; E=1,11	-	Hidratación	Aloja/añapa	Endo: bien conservado
			Endocarpo fragmentado	L=4,94; A=2,91; E=0,52	-	Mortereado	Harina-Aloja/añapa	Endo: fisurado
			Endocarpo fragmentado	L=3,93; A=3,09; E=0,98	-	-	-	Endo: fisurado
			Endocarpo fragmentado	L=3,76; A=1,7; E=0,57	-	-	-	-
	<i>Prosopis</i> posible híbrido con <i>flexuosa</i>		Artejo	L=9,64; A=7,39; E=5,23	Apiculada	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches, extremos levantados; Meso: TSA; Endo: cerrado
Total		8						
A2 30-50 Pared Este	<i>P. chilensis</i>		Semilla	L=5,66; A=4,64; E=1,29	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Testa arrugada, altamente fragmentada; eE; cotiledones visibles

	<i>P. flexuosa</i>		Medio endocarpo con semilla	Endo: L=7,72; A=4,25; E=2,73; Sem: L=5,08; A=4,92; E=2,6; DLF=2,22; APLF=1,27; DCLF=0,88	Sem: ovoidal, zona calazal ancha y redondeada	Hidratación	Aloja/añapa	Sem: testa arrugada, plegada, ausente parcialmente
	<i>P. cf. P. flexuosa</i>		Semilla fragmentada	L=4,1; A=3,09; E=2,29; DLF=1,44; APLF=0,76	Ovoidal	Hidratación	Aloja/añapa	Sem: deteriorada, fragilidad, testa arrugada; cotiledones visibles
			Medio artejo	Artejo: L=7,69; A=5,91; E=2,4; Endo: L=6,26; A=4,29; E=0,4	Endo: romboidal	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: parches; Meso: TSA, HFV
	<i>Prosopis</i> spp.		Endocarpo	L=7,27; A=5,37; E=3,41	Rectangular	Mortereado	Harina- Aloja/añapa	Endo: bien conservado, valvas separadas
			Medio endocarpo	L=7,34; A=4,57; E=1,16	Rectangular	Mortereado	Harina no refinada- Aloja/añapa	Meso adherido: TC; Endo: fragmentado; Sem adosada: fragmentada
			Semilla	L=4,65; A=4,43; E=2,13	Redondeada	Hidratación	Aloja/añapa	Sem: redondeada, deteriorada, fragilidad, parches de testa, eE
Total		7						

A2 piso	<i>Prosopis</i> spp.		Artejo fragmentado	L=6,35; A=4,06; E=1,86	-	Hidratación	Aloja/añapa	Epi: arrugas transversales, extremos levantados, separados, bien conservado; Meso: TSA, HFV
Total		1						